

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**使用上の注意**

**相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]
●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

[用法・用量]

年 齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞
定められた用法・用量を厳守してください。

- [保管及び取扱い上の注意]**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社
お客様相談窓口
電話 06-6562-7411
受付時間 10:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

滋養強壮
HELVITA
KO-W
ROYAL
ヘルビタ
黄W
ローヤル



Vitamin B1 • B2 • B6, Nicotinamide, Pantothenyl Alcohol, Vitamin E, Taurine, Anhydrous Caffeine, Polygonati Fluid Extract, Epimedii Fluid Extract, Viper Tincture, Civet Tincture, Bezoar Tincture, Rehmannia Dried Extract, Crataegus

第2類医薬品

50mL

第2類医薬品

販売名:ヘルビタ黄Wローヤル

[成分・分量] 1びん(50mL)中

チアミン硝酸物……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム……………15mg
ピリドキシン塩酸塩……………30mg
ニコチン酸アミド……………30mg
パンテノール……………30mg
トコフェロール酢酸エステル……………30mg
無水カフェイン……………50mg
タウリン……………1,000mg
ローヤルゼリー……………100mg
ニンジン乾燥エキス……………180mg
ジオウ乾燥エキス……………180mg
セイヨウサンザシエキス……………30mg
ゴウチンキ……………750μL
シベットチンキ……………750μL
ハンピチンキ……………300μL
イカリソウ流エキス……………1,000μL
オウセイ流エキス……………2,000μL
(アルコール1.5mL以下)

添加物:安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール、白糖、還元麦芽糖水アメ

＜成分・分量に関連する注意＞

- 本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。
- 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

使用期限 / LOT NO.

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2